

DENGUE, LEPTOSPIROSIS, PALUDISMO Y SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS (SPH)

Algoritmo para el diagnóstico diferencial en fase de inicio

HIPERTERMIA - MIALGIAS - CEFALEA

Ausencia de sintomatología de la vía aérea superior con o sin:

- Dolor abdominal, náuseas, vómitos.
- Hiperemia conjuntival
- Odinofagia
- Episodio diarreico
- (Con artralgias y/o exantema pruriginoso sospechar Dengue)

Control en 48 a 72 horas - Realizar hemograma y VSG

Neumonía grave

- Exantema pruriginoso
- Leucopenia
- linfomonocitosis
- VSG normal o baja con o sin trombocitopenia

- Ictericia
- Sin esplenomegalia
- Leucocitosis - neutrofilia
- VSG elevado
- Con o sin trombocitopenia

- Leucocitosis
- Neutrofilia
- VSG elevado
- Sangrado pulmonar

- Leucocitosis
- Neutrofilia
- Linfomonocitos atípicos
- Trombocitopenia
- VSG normal

- Fiebre intermitente con escalofríos.
- Hemograma normal o trombocitopenia y/o anemia hemolítica.
- VSG normal o aumento moderado.
- Esplenomegalia frecuente

DENGUE

LEPTOSPIROSIS "CLASICA"

LEPTOSPIROSIS (Hemorragia pulmonar)

SPH

PALUDISMO

EVALUAR

- Signos de alerta para DH**
- Extravasación plasmática
 - Hemorragias

EVALUAR

- Función renal
- Meningitis
- Neumopatía
- Hemorragias

EVALUAR

- Insuficiencia cardiorrespiratoria

EVALUAR

- Frotis o gota gruesa
- Procedencia del enfermo: regiones con o sin circulación de *P. falciparum* (paludismo grave).

- Considerar antecedentes epidemiológicos.
- Según la procedencia del paciente pueden considerarse otros diagnósticos: fiebre hemorrágica Argentina, rickettsiosis, triquinosis, cuadros virales sin afección respiratoria de inicio y enfermedades no infecciosas.
- En el período de estado cada enfermedad tiene diagnósticos diferenciales según la forma clínica que adopte.
- En este cuadro no se consideran los elementos clínicos o de laboratorio para evaluar la fase de estado.